PRIMEIRAS PESQUISAS SÔBRE A BIOTIPOLOGIA DE SHELDON APLICADA A UM GRUPO DE VENDEDORES BALCONISTAS. (*)

PIERRE WEIL, RAUL MOREIRA LELLIS, JACYR MAIA E GERMANA DE FIGUEIREDO

I) DADOS BIBLIOGRÁFICOS.

As pesquisas realizadas sôbre o biotipo de vendedores são poucas no mundo inteiro.

Anderson (1929), tomando o pêso e a altura de 284 vendedores, comparou as médias de bons vendedores e de vendedores inferiores, depois de ter eliminado os 50% de indivíduos médios; achou poucas diferenças entre o pêso e a altura dos dois grupos.

Kitson (1925) já tinha achado uma correlação baixa: de .11 para o pêso e de .05 para a altura dos vendedores.

Boumier (1938) afirma que, segundo inquéritos efetuados em grandes lojas, o vendedor de sapatos deve ser, de preferência, pequeno e o vendedor de chapéus, grande; não apresenta, porém, comprovação experimental dessas afirmações.

Não achamos, além dêsses elementos, nenhuma pesquisa tipológica pròpriamente dita sôbre vendedores, o que representa, ao nosso ver, grande lacuna.

II) EXPERIÊNCIAS DO SENAC:

O novo sistema de classificação biotipológica de Sheldon apresenta a vantagem de ter um sistema de avaliação numérica que permita um tratamento mais rigoroso de exames em grande escala, além de ser um processo de síntese entre várias tipologias antigas.

Os estudos de Sheldon são muito recentes e não houve ainda tempo para aplicá-los ao comércio. O autor limitou-se, até hoje, a vasto estudo sôbre uma população de homens e de delinqüentes. A pesquisa que relatamos a seguir é possìvelmente a primeira realizada sôbre a função de vendedores. Isto nos foi possível, por têrmos conseguido a autorização dos diretores de duas emprêsas de

(*) As experiências foram realizadas no Laboratório de Psicologia da Seção de Orientação e Seleção Profissional do Departamento Nacional do S.E.N.A.C., com a colaboração de duas grandes Emprêsas Comerciais do Distrito Federal.

vendedores de tecidos do Distrito Federal, com lojas espalhadas em todos os pontos da cidade, o que nos permite ter amostra mais representativa da população estudada.

Conseguimos examinar, individualmente, 106 vendedores balconistas de tecidos do sexo masculino, e 35 indivíduos tomados ao acaso, não vendedores, servindo de ponto de comparação.

Eis as médias achadas para, além dos três componentes, a displasia, o ginandromorfismo, o hirsutismo e a labilidade nervosa:

	BALCONISTAS		INDIVÍDUOS TOMADOS AO ACASO	
	M	*D.P.*	*M*	*D.P.*
Endomorfismo:	3,88	:1,17	4,13	:1,22
Mesomorfismo:	4,38	:0,96	4,45	:0,86
Ectomorfismo:	4,01	:1,23	3,73	:1,31
Displasia:	3,68	:0,95	3,07	:1,63
Ginandromorfismo:	4,27	:0,46	4,36	:0,75
Hirsutismo:	3,42	:1,30	3,67	:1,38
Labilidade nervosa:				
TIPOS:				
Simpaticotônicos:		42,45%		14,29%
Simpaticolábeis:		4,72%		12,24%
Indiferentes:		2,83%		2,86%
Vagotônicos:		29,25%		11,43%
Vagolábeis:		20,75%		51,42%
Anfotônicos:		00,00%		5,71%

Não há nenhuma diferença estatìsticamente significativa entre os dois grupos para os três componentes, a displasia, o ginandromorfismo e o hirsutismo.

No entanto, a diferença entre os dois grupos para percentagem de simpaticotônicos e de vagotônicos é muito grande e estatìsticamente significativa.

CONCLUSÕES:

Se pensamos na rapidez de reações necessária para ser vendedor-balconista de tecidos, não nos devemos surpreender pela predominância de simpaticotônicos nos balconistas; desejamos que êste trabalho incentive outras pesquisas, notadamente para verificar se tais dados podem ser transpostos para outras categorias de vendedores.

BIBLIOGRAFIA:

Anderson, V. V.: Psychiatry in Industry. New York: Harper and Brothers, 1929. XV: 364, pp. 222 — 243.

Boumier: "Etude du Métier de Vendeur". BINOP. Paris 1938.

Kitson, H. D.: "Psychology on vocational adjustement" — Filadelfia: J. B. Lippingcott Company, 1925, pp. 84-90.

Sheldon e Steavens: "Les Varietés du Physique Humain". P. U. F. Paris, 1951.

RESUMÉ

Après avoir examiné 106 vendeurs de tissus de différents ma-

gasins de Rio de Janeiro, avec la technique biotypologique de Sheldon et Stevens, les auteurs comparent les résultats obtenus avec ceux d'un échantillon pris au hasard.

Aucune différence statistiquement significative n'a été trouvée entre les deux groupes pour le mésomorphisme, l'endomorphisme et l'ectomorphisme, ni même pour le gynandromorphisme, l'hirsutisme et la dysplasie.

Les différences sont marquantes et statistiquement significatives pour la labilité nerveuse, les vendeurs étant en grande proportion Sympaticotoniques.

SUMMARY

The authors study 106 weave's sellers from different Rio de Janeiro shops, by means of the Sheldon-Stevens biotypological technique, and after make a comparison with the results obtained from a "randomic" sample.

They have not found any statiscal difference between the two groups, according to mesomorphy, endomorphy, and ectomorphy, neither concerning ginandromorphy, hirsutism and dysplasia. Differences are remarkable statiscally significant on nervous lability. Most of that sellers are simpaticotonics.